

NECROSIS CUTÁNEA EN FOCO DE FRACTURA TRAS FRACTURA DE TIBIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Mínguez Pérez, H. Ferrete Barroso, A M. Ortiz Pereira, P. Zuil Acosta, P.

❑ **Objetivos:** Aportar opciones de tratamiento en casos de necrosis cutánea por afectación de partes blandas tras una fractura.

❑ **Material y métodos:**

- Varón de 65 años que presenta fractura diafisaria de tibia.
- Inicialmente se opta por tratamiento conservador ya que el paciente es no deambulante.
- A las 2 semanas se aprecia desplazamiento de la fractura asociada a necrosis cutánea



❑ **Resultados:**

- Se interviene quirúrgicamente realizando enclavado endomedular asociado a colgajo fasciocutáneo de cobertura e injerto de piel en zona donante del colgajo que se obtiene del muslo ipsilateral.
- En el postoperatorio precisa terapia de vacío por tejido desvitalizado en zona distal del colgajo, consiguiendo cierre de herida.
- Se consigue consolidación de la fractura visible en radiografía a 3 meses.

❑ **Conclusiones:** En fracturas con gran afectación de partes blandas, es fundamental una buena cobertura del foco de fractura para conseguir la consolidación precoz y evitar la infección y pseudoartrosis. Pueden ser necesarios gestos quirúrgicos encaminados a la cobertura del foco de fractura asociados a la osteosíntesis.