



# ARTRODESIS TOTAL DE MUÑECA: INDICACIONES Y RESULTADOS CLÍNICOS

J. A. OTEO MALDONADO - R. ESCOBAR SANTIAGO – P. MERINO CARRETERO – V. CALZADA EXPÓSITO  
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

**EDAD MEDIA**  
52 AÑOS

**DCHAS** 25  
**IZDAS** 14


**22** **17**



SE HIZO SIEMPRE ARTRODESIS A TERCER MTC  
FUSIONANDO ART. GRANDE-MTC  
CON PLACA PRECONFORMADA



**CARPECTOMÍA PROXIMAL**  
**18 SI**  
**23 NO**




**NECESIDAD DE ACORTAMIENTO CUBITAL  
TRAS LA ARTRODESIS**  
**8 PACIENTES**  
SI RELACIÓN ENTRE NO HACER CARPECTOMÍA  
PROXIMAL Y POSTERIOR NECESIDAD DE  
ACORTAMIENTO CUBITAL  
P 0.049 T. FISHER

**PUÑO/EXTENSIÓN DE LOS DEDOS COMPLETA**  
**34 PACIENTES**

**PRONO/SUPINACIÓN COMPLETA**  
**32 PACIENTES**

**TIEMPO MEDIO CONSOLIDACIÓN**  
**4,4 MESES**  
NO RELACIÓN CONSOLIDACIÓN Y TABACO  
P 0.0330 T. WILCOXON

**EXTRACCIÓN MATERIAL POR MOLESTIAS**  
**7 PACIENTES**



**EVA**  
ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR  
**PREQUIRÚGICO 7,8**  
**POSTQUIRÚRGICO 1,22**  
SI HAY CAMBIO ESTADÍSTICAMENTE  
SIGNIFICATIVO EN EL VALOR DE LA EVA  
P 0.000 T. WILCOXON