

# QUISTE ÓSEO PRIMER METACARPIANO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Illana Amillano I., Carretero Guillen JA., Pérez Campos M., González Suarez JJ. HU Puerto Real.

## OBJETIVOS

Exponer un caso clínico de una tumoración benigna intraósea en primer metacarpiano en un paciente varón, activo y en edad laboral, de 55 años de edad, que consultaba por dolor intenso en primer dedo izquierdo que achacaba a un golpe que se había dado, refiriendo que la clínica comenzó en ese momento y empeoraba desde entonces.

## MATERIAL Y METODOLOGÍA

Revisión de bibliografía disponible sobre casos similares, utilizando el buscador de la base de datos Pubmed. El paciente fue intervenido realizándose legrado de la cavidad y posterior injerto óseo autólogo procedente de cresta ilíaca.



## RESULTADOS

Tras 5 meses de intervención quirúrgica el injerto se ha integrado satisfactoriamente, la cicatriz quirúrgica presenta buen aspecto y la clínica del paciente ha remitido.



## CONCLUSIONES

El diagnóstico de tumores óseos debe pasar por una exploración física, anamnesis y pruebas complementarias, esencialmente radiografías simples, para poder estudiar la naturaleza de la lesión y proponer al paciente un tratamiento acorde. El legrado cavitario e injerto de hueso autólogo es una solución con buenos resultados para quistes óseos simples localizados en metacarpianos y falanges.